

Cow Riser VIII

DFAⅢ

糖蜜

Ca吸収促進

カウライザーVIII®

～分娩後の良好な立ち上がりへ～
飲ませるだけで低Ca血症予防

カルシウム
チャージ!



Cow Riser VIII neo

カウライザーVIII neo®

利便性UP

ベタイン

～周産期を乗り切る～
使い易くなったカウライザー

オリゴ糖(DFAⅢ)を用いたミネラル吸収促進剤は**当社だけ!**

DFAⅢ、カルシウム、マグネシウム、ベタインが
低Ca血症を引き金とした**周産期疾病を予防**します。
糖蜜とアルコールが分娩後の牛のエネルギーとなり、
分娩後の良好な立ち上がりに寄与します。



ニッテン配合飼料



カウライザー VIII®

Cow Riser VIII



カウライザー VIIIneo®

Cow Riser VIII neo



主原料(カウライザーVIII)

糖蜜、オリゴ糖(DFAIII)、
カルシウム、マグネシウム、
アルコール

基本情報

用途 分娩牛用
荷姿 12本・箱
形状 ボトル
備考 カウライザーVIIIは
冬季は沈殿の固化に注意

主原料(カウライザーVIIIneo)

糖蜜、オリゴ糖(DFAIII)、
カルシウム、マグネシウム、
アルコール、ベタイン

使用方法

分娩後、1日1本を3日間(計3本) 給与してください。別途Ca剤を給与する事を推奨しています。


ボトルになっており、牛を保定して経口投与してください。*誤嚥に注意
嫌がる牛にはバケツなどの器に開けて飲ませてください。

カウライザーの給与効果

カウライザーに含まれるDFA IIIはルーメンで分解されない事が特徴のオリゴ糖で、チコリの根に含まれるイヌリンから酵素合成で製造されます。

DFA IIIは十二指腸の細胞と細胞の隙間を広げ、腸管から血管へCaを通りやすくして吸収を促進します。

2産以上の経産牛に対して、乾乳期にDFA III 50g/日、分娩後と分娩6時間後にDFA III 90gと炭酸Ca100gを給与したところ、産次の増加による分娩直後の血中Ca濃度低下は見られず、Ca吸収促進効果があることが示されました(図)。



佐藤ら、2007日本家畜臨床学会誌Vol78(1): 37-43

DFAIII関連製品情報

飼養頭数が多い牧場には、カウライザーVIII neoのキュービテナー製品「カウライザーDice」がおすすめです。
DFA IIIと糖蜜を含有した固形飼料「ニッテン元氣玉」もご紹介します。



日本甜菜製糖株式会社 飼料事業部

お問い合わせ Tel: 0155-48-4103 Fax: 0155-48-9607
ホームページ nitten-feed.jp

公式HP



Facebook



Instagram



公式キャラクター
「ミルテン」