

Immuno Accel®

DFAⅢ

免疫吸収促進

イムノアクセル®

~6グラムのおまじない~
初乳に混ぜるだけで
免疫吸収率UP



出生後の
マスト
アイテム

Immuno Accel® Gel

利便性UP

イムノアクセル® ジェル



ちゅ~っとあげやすい!
液状なので経口投与が
可能になりました

コウシのミカタがリニューアル!

効果はそのままにジェルタイプも新登場。

DFAⅢが免疫物質(IgG)の吸収を促進し、
健康な子牛の成長をサポートします。



ニッテン配合飼料

イムノアクセル®

Immuno Accel®



基本情報(イムノアクセル®)

荷姿 6g(50包入)

形状 顆粒

使用方法

1回に1包を初乳や初乳製剤に混ぜて飲ませてください。

ジェルは直接給与が可能です。

出生後24～36時間以内を目安に2回給与を推奨しております。

免疫物質(IgG)の重要性

子牛の免疫グロブリン吸収能力は出生後24～36時間で吸収されなくなると言われているため、出生後数時間以内に初乳を必ず飲ませる必要があります。また、IgG含有量の多い初乳をできるだけ多く飲ませることも重要です。

図1のようにIgGの吸収率によって生存率が変わってきます。




図1 子牛の血清中IgG濃度と生存率

イムノアクセル® ジェル

Immuno Accel® Gel



基本情報(イムノアクセル®ジェル)

荷姿 10g(50包入)

形状 液状

IgGの吸収率を高めるために

ホルスタイン種新生子牛の出生後給与する初乳から生後7日までの間に給与する乳に、DFA IIIを1回当たり0～18g混合給与したときの血清中のIgG濃度の推移を示しました(図2)。

DFA IIIを6g、18g給与した子牛の血清中IgG濃度が高く、その後も高い値を維持しました。




図2 DFA III 給与量の検討



日本甜菜製糖株式会社 飼料事業部

お問い合わせ Tel:0155-48-4103 Fax:0155-48-9607
ホームページ nitten-feed.jp

公式HP



Facebook



Instagram



NITTENFEED

給与動画

